

微积分课程

# 第九章 · 微分方程与差分方程

2020 年 8 月 29 日

■ 暨南大学数学系 ■ 吕荐瑞

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

定义 1 含有未知函数的导数或微分的方程

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

称为微分方程.

定义 1 含有未知函数的导数或微分的方程

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

称为微分方程. 其中出现的导数的最高阶数  $n$ , 称为微分方程的阶.

定义 1 含有未知函数的导数或微分的方程

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

称为微分方程. 其中出现的导数的最高阶数  $n$ , 称为微分方程的阶.

例子 判别下列微分方程的阶数:

$$(1) \frac{dy}{dx} + y = x$$

$$(2) x dx - y^2 dy = 0$$

$$(3) y'' + y' = e^x$$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

将  $x = 1$  时  $y = 3$  代入上式，得到  $C = 2$ .

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

将  $x = 1$  时  $y = 3$  代入上式，得到  $C = 2$ . 因此

$$y = x^2 + 2$$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数}) \dots \dots \dots \text{通解}$$

将  $x = 1$  时  $y = 3$  代入上式，得到  $C = 2$ . 因此

$$y = x^2 + 2$$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$  初始条件

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数}) \dots \dots \dots \text{通解}$$

将  $x = 1$  时  $y = 3$  代入上式，得到  $C = 2$ . 因此

$$y = x^2 + 2$$

例 1 求解一阶微分方程  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x \\ y|_{x=1} = 3 \end{cases}$  初始条件

解答 对方程两边积分，得到

$$y = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数}) \quad \dots \dots \dots \text{ 通解}$$

将  $x = 1$  时  $y = 3$  代入上式，得到  $C = 2$ . 因此

$$y = x^2 + 2 \quad \dots \dots \dots \text{ 特解}$$

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数)

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) … 通解

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) … 通解

将初始条件  $y'|_{x=0} = 1$  代入 ①，得到  $C_1 = 1$ .

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) … 通解

将初始条件  $y'|_{x=0} = 1$  代入 ①，得到  $C_1 = 1$ .

将初始条件  $y|_{x=0} = 0$  代入 ②，得到  $C_2 = 0$ .

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) … 通解

将初始条件  $y'|_{x=0} = 1$  代入 ①，得到  $C_1 = 1$ .

将初始条件  $y|_{x=0} = 0$  代入 ②，得到  $C_2 = 0$ . 因此

例 2 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

解答 对方程两边积分，得到

①  $y' = -x + C_1$  ( $C_1$  为常数)

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) … 通解

将初始条件  $y'|_{x=0} = 1$  代入 ①，得到  $C_1 = 1$ .

将初始条件  $y|_{x=0} = 0$  代入 ②，得到  $C_2 = 0$ . 因此

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

**例 2** 求解二阶微分方程  $\begin{cases} y'' = -1, \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1. \end{cases}$

**解答** 对方程两边积分，得到

$$① \quad y' = -x + C_1 \quad (C_1 \text{ 为常数})$$

再对前式两边积分，得到

②  $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$  ( $C_1, C_2$  为常数) ... 通解

将初始条件  $y'|_{x=0} = 1$  代入 ①, 得到  $C_1 = 1$ .

将初始条件  $y|_{x=0} = 0$  代入 ②, 得到  $C_2 = 0$ . 因此

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x \quad \dots \dots \dots \text{特解}$$

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

# 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式为  $F(x, y, y') = 0$ . 对应的初始条件为  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

# 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式为  $F(x, y, y') = 0$ . 对应的初始条件为  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

在这一节中，我们将研究 3 种一阶微分方程：

# 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式为  $F(x, y, y') = 0$ . 对应的初始条件为  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

在这一节中，我们将研究 3 种一阶微分方程：

## 1 可分离变量微分方程

# 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式为  $F(x, y, y') = 0$ . 对应的初始条件为  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

在这一节中，我们将研究 3 种一阶微分方程：

- 1 可分离变量微分方程
- 2 齐次微分方程

# 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式为  $F(x, y, y') = 0$ . 对应的初始条件为  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

在这一节中，我们将研究 3 种一阶微分方程：

- 1 可分离变量微分方程
- 2 齐次微分方程
- 3 一阶线性微分方程

## 第二节

### 一阶微分方程

A

可分离变量微分方程

B

齐次微分方程

C

一阶线性微分方程

## (-) 可分离变量微分方程

形如  $f(y) dy = g(x) dx$  的方程称为可分离变量微分方程.

## (-) 可分离变量微分方程

形如  $f(y) dy = g(x) dx$  的方程称为可分离变量微分方程.

对这种方程的两边同时积分，就可以求出它的通解.

# 可分离变量微分方程

例 1 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$  的通解.

# 可分离变量微分方程

例 1 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$  的通解.

练习 1 求微分方程  $(1 + y)dx - (1 - x)dy = 0$  的通解.

# 可分离变量微分方程

例2 求微分方程  $y' = -\frac{x}{y}$  在初始条件  $y|_{x=0} = 1$  下的特解.

# 可分离变量微分方程

例2 求微分方程  $y' = -\frac{x}{y}$  在初始条件  $y|_{x=0} = 1$  下的特解.

练习2 求微分方程  $\frac{x}{1+y} dx - \frac{y}{1+x} dy = 0$  满足初始条件  $y|_{x=0} = 1$  的特解.

# 可分离变量微分方程

例3 求微分方程  $y' = 2xy^2$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=0} = -1$  下的特解.

# 可分离变量微分方程

例3 求微分方程  $y' = 2xy^2$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=0} = -1$  下的特解.

解答 通解为  $y = -\frac{1}{x^2 + C}$ .

# 可分离变量微分方程

例3 求微分方程  $y' = 2xy^2$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=0} = -1$  下的特解.

解答 通解为  $y = -\frac{1}{x^2 + C}$ .

注记 通解  $\neq$  全部解.

## 第二节

### 一阶微分方程

A

可分离变量微分方程

B

齐次微分方程

C

一阶线性微分方程

## (二) 齐次微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

的微分方程称为齐次微分方程.

## (二) 齐次微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

的微分方程称为齐次微分方程.

例如：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y}{x + y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - x^2}$$

# 齐次微分方程的解法

1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ ,

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ , 则有  $y = xv$ ,

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ , 则有  $y = xv$ , 从而  
$$\frac{dy}{dx} = x\frac{dv}{dx} + v.$$

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ , 则有  $y = xv$ , 从而  
 $\frac{dy}{dx} = x\frac{dv}{dx} + v$ . 代入原方程得到

$$x\frac{dv}{dx} + v = f(v)$$

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ , 则有  $y = xv$ , 从而  
 $\frac{dy}{dx} = x\frac{dv}{dx} + v$ . 代入原方程得到

$$x\frac{dv}{dx} + v = f(v)$$

- 3 分离变量：得到  $\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x}$

# 齐次微分方程的解法

- 1 标准化：将微分方程化为  $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$
- 2 换元：令  $v = \frac{y}{x}$ , 则有  $y = xv$ , 从而  
 $\frac{dy}{dx} = x\frac{dv}{dx} + v$ . 代入原方程得到

$$x\frac{dv}{dx} + v = f(v)$$

- 3 分离变量：得到  $\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x}$

- 4 两边积分：得到通解，然后将  $v$  代回

# 齐次微分方程

例 4 求  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - x^2}$  的通解.

# 齐次微分方程

例 4 求  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - x^2}$  的通解.

练习 3 求微分方程  $y' = \frac{y+x}{x}$  的通解.

例 5 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

**例 5** 求微分方程  $\left( x \tan \frac{y}{x} + y \right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

**解答** 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

例 5 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

解答 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

■ 令  $v = \frac{y}{x}$ , 得到  $x \frac{dv}{dx} + v = \tan v + v$ .

**例 5** 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

解答 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

■ 令  $v = \frac{y}{x}$ , 得到  $x \frac{dv}{dx} + v = \tan v + v$ .

■ 分离变量, 得到  $\cot v dv = \frac{dx}{x}$ .

例 5 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

解答 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

■ 令  $v = \frac{y}{x}$ , 得到  $x \frac{dv}{dx} + v = \tan v + v$ .

■ 分离变量, 得到  $\cot v dv = \frac{dx}{x}$ .

■ 两边积分, 得到  $\ln |\sin v| = \ln |x| + C_0$ .

**例 5** 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

**解答** 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

- 令  $v = \frac{y}{x}$ , 得到  $x \frac{dv}{dx} + v = \tan v + v$ .

- 分离变量, 得到  $\cot v dv = \frac{dx}{x}$ .

- 两边积分, 得到  $\ln |\sin v| = \ln |x| + C_0$ .

- 整理等式, 得到  $\sin v = Cx$ , 即  $\sin \frac{y}{x} = Cx$ .

例5 求微分方程  $\left(x \tan \frac{y}{x} + y\right) dx = x dy$  在初始条件  $y|_{x=2} = \pi$  下的特解.

解答 方程即为  $\frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$ .

■ 令  $v = \frac{y}{x}$ , 得到  $x \frac{dv}{dx} + v = \tan v + v$ .

■ 分离变量, 得到  $\cot v dv = \frac{dx}{x}$ .

■ 两边积分, 得到  $\ln |\sin v| = \ln |x| + C_0$ .

■ 整理等式, 得到  $\sin v = Cx$ , 即  $\sin \frac{y}{x} = Cx$ .

代入初始条件, 得到  $C = \frac{1}{2}$ , 故特解为  $\sin \frac{y}{x} = \frac{1}{2}x$ .

练习4 求微分方程  $(x^2 + y^2) dx - xy dy = 0$  在初始条件  $y|_{x=1} = 0$  下的特解.

## 第二节

### 一阶微分方程

A

可分离变量微分方程

B

齐次微分方程

C

一阶线性微分方程

### (三) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

### (三) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

- 若  $q(x) \equiv 0$ , 称为一阶线性齐次微分方程
- 若  $q(x) \not\equiv 0$ , 称为一阶线性非齐次微分方程

### (三) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

- 若  $q(x) \equiv 0$ , 称为一阶线性齐次微分方程
  - 若  $q(x) \not\equiv 0$ , 称为一阶线性非齐次微分方程
- .....

(1)  $y' + xy = x^2$       ✓

### (三) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

- 若  $q(x) \equiv 0$ , 称为一阶线性齐次微分方程
- 若  $q(x) \not\equiv 0$ , 称为一阶线性非齐次微分方程

(1)  $y' + xy = x^2$       ✓

(2)  $y' + y^2 = \sin x$       ✗

### (三) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

- 若  $q(x) \equiv 0$ , 称为一阶线性齐次微分方程
  - 若  $q(x) \not\equiv 0$ , 称为一阶线性非齐次微分方程
- .....

(1)  $y' + xy = x^2$       ✓

(2)  $y' + y^2 = \sin x$       ✗

(3)  $yy' + xy = 1$       ✗

# 一阶线性齐次微分方程

先看一阶线性齐次微分方程  $y' + p(x)y = 0$ .

# 一阶线性齐次微分方程

先看一阶线性齐次微分方程  $y' + p(x)y = 0$ .

.....

分离变量得到

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx$$

# 一阶线性齐次微分方程

先看一阶线性齐次微分方程  $y' + p(x)y = 0$ .

.....

分离变量得到

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx$$

两边同时积分，得到

$$\ln|y| = - \int p(x) dx + C_0$$

# 一阶线性齐次微分方程

先看一阶线性齐次微分方程  $y' + p(x)y = 0$ .

.....

分离变量得到

$$\frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

两边同时积分，得到

$$\ln|y| = - \int p(x)dx + C_0$$

消去对数，得到通解为（其中  $C = \pm e^{C_0}$ ）

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 6 求微分方程  $y' + \frac{1}{x}y = 1$  的通解.

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 6 求微分方程  $y' + \frac{1}{x}y = 1$  的通解.

1 恒等变形:  $xy' + y = x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 6 求微分方程  $y' + \frac{1}{x}y = 1$  的通解.

- 1 恒等变形:  $xy' + y = x$
- 2 合并左边:  $(xy)' = x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 6 求微分方程  $y' + \frac{1}{x}y = 1$  的通解.

- 1 恒等变形:  $xy' + y = x$
- 2 合并左边:  $(xy)' = x$
- 3 两边积分:  $xy = \frac{1}{2}x^2 + C$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 6 求微分方程  $y' + \frac{1}{x}y = 1$  的通解.

- 1 恒等变形:  $xy' + y = x$
- 2 合并左边:  $(xy)' = x$
- 3 两边积分:  $xy = \frac{1}{2}x^2 + C$
- 4 得到通解:  $y = \frac{1}{2}x + C\frac{1}{x}$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

例 7 求微分方程  $y' - \frac{1}{x}y = x^2$  的通解.

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 7 求微分方程  $y' - \frac{1}{x}y = x^2$  的通解.

1 恒等变形:  $\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 7 求微分方程  $y' - \frac{1}{x}y = x^2$  的通解.

1 恒等变形:  $\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x$

2 合并左边:  $\left(\frac{1}{x}y\right)' = x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 7 求微分方程  $y' - \frac{1}{x}y = x^2$  的通解.

1 恒等变形:  $\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x$

2 合并左边:  $\left(\frac{1}{x}y\right)' = x$

3 两边积分:  $\frac{1}{x}y = \frac{1}{2}x^2 + C$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 7 求微分方程  $y' - \frac{1}{x}y = x^2$  的通解.

1 恒等变形:  $\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x$

2 合并左边:  $\left(\frac{1}{x}y\right)' = x$

3 两边积分:  $\frac{1}{x}y = \frac{1}{2}x^2 + C$

4 得到通解:  $y = \frac{1}{2}x^3 + Cx$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

例 8 求微分方程  $y' + y = 1$  的通解.

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 8 求微分方程  $y' + y = 1$  的通解.

1 恒等变形:  $e^x y' + e^x y = e^x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 8 求微分方程  $y' + y = 1$  的通解.

- 1 恒等变形:  $e^x y' + e^x y = e^x$
- 2 合并左边:  $(e^x y)' = e^x$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 8 求微分方程  $y' + y = 1$  的通解.

1 恒等变形:  $e^x y' + e^x y = e^x$

2 合并左边:  $(e^x y)' = e^x$

3 两边积分:  $e^x y = e^x + C$

# 一阶线性非齐次微分方程

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....  
例 8 求微分方程  $y' + y = 1$  的通解.

- 1 恒等变形:  $e^x y' + e^x y = e^x$
- 2 合并左边:  $(e^x y)' = e^x$
- 3 两边积分:  $e^x y = e^x + C$
- 4 得到通解:  $y = 1 + Ce^{-x}$

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

1 恒等变形:  $v(x)y' + p(x)v(x)y = q(x)v(x)$

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

- 1 恒等变形:  $v(x)y' + p(x)v(x)y = q(x)v(x)$
- 2 合并左边:  $(v(x)y)' = q(x)v(x)$

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

- 1 恒等变形:  $v(x)y' + p(x)v(x)y = q(x)v(x)$
- 2 合并左边:  $(v(x)y)' = q(x)v(x)$
- 3 两边积分:  $v(x)y = \int q(x)v(x)dx + C$

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

- 1 恒等变形:  $v(x)y' + p(x)v(x)y = q(x)v(x)$
- 2 合并左边:  $(v(x)y)' = q(x)v(x)$
- 3 两边积分:  $v(x)y = \int q(x)v(x)dx + C$
- 4 得到通解:  $y = \frac{1}{v(x)} \left( \int q(x)v(x)dx + C \right)$

# 积分因子法

再看一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$ .

.....

- 1 恒等变形:  $v(x)y' + p(x)v(x)y = q(x)v(x)$
- 2 合并左边:  $(v(x)y)' = q(x)v(x)$
- 3 两边积分:  $v(x)y = \int q(x)v(x)dx + C$
- 4 得到通解:  $y = \frac{1}{v(x)} \left( \int q(x)v(x)dx + C \right)$

问题 积分因子  $v(x)$  是否一定存在? 如何求出它?

# 积分因子法

问题 寻找  $v = v(x)$  使得  $vy' + p(x)vy = (vy)'$ .

# 积分因子法

问题 寻找  $\nu = \nu(x)$  使得  $\nu y' + p(x) \nu y = (\nu y)'$ .

解答 展开等式右边得  $\nu y' + p(x) \nu y = \nu y' + \nu' y.$

# 积分因子法

问题 寻找  $\nu = \nu(x)$  使得  $\nu y' + p(x) \nu y = (\nu y)'$ .

解答 展开等式右边得  $\nu y' + p(x) \nu y = \nu y' + \nu' y.$

■ 化简条件:  $p(x) \nu = \nu'$ ,

# 积分因子法

问题 寻找  $\nu = \nu(x)$  使得  $\nu y' + p(x) \nu y = (\nu y)'$ .

解答 展开等式右边得  $\nu y' + p(x) \nu y = \nu y' + \nu' y.$

■ 化简条件:  $p(x) \nu = \nu'$ , 即  $p(x) \nu = \frac{d\nu}{dx}$

# 积分因子法

问题 寻找  $v = v(x)$  使得  $vy' + p(x)vy = (vy)'$ .

解答 展开等式右边得  $vy' + p(x)vy = vy' + v'y.$

- 化简条件:  $p(x)v = v'$ , 即  $p(x)v = \frac{dv}{dx}$
- 分离变量:  $\frac{dv}{v} = p(x)$

# 积分因子法

问题 寻找  $v = v(x)$  使得  $vy' + p(x)vy = (vy)'$ .

解答 展开等式右边得  $vy' + p(x)vy = vy' + v'y.$

- 化简条件:  $p(x)v = v'$ , 即  $p(x)v = \frac{dv}{dx}$
- 分离变量:  $\frac{dv}{v} = p(x)$
- 求解方程:  $\ln v = \int p(x) dx$ , 即  $v = e^{\int p(x) dx}$

# 一阶线性微分方程的通解

对一阶线性非齐次微分方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

# 一阶线性微分方程的通解

对一阶线性非齐次微分方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

令积分因子为

$$\nu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

# 一阶线性微分方程的通解

对一阶线性非齐次微分方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

令积分因子为

$$\nu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

则方程的通解为

$$y = \frac{1}{\nu(x)} \left( \int q(x)\nu(x) dx + C \right)$$

例 9 求  $y' - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3$  的通解.

例 9 求  $y' - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3$  的通解.

练习 5 求  $y' + y = e^{-x}$  的通解.

复习 1 求方程  $xy \, dx + \sqrt{1 - x^2} \, dy = 0$  的通解.

复习 2 求微分方程  $(x + y)dx + x dy = 0$  的通解.

复习 3 求一阶微分方程  $xy' + y = 3x^2$  在初始条件  $y|_{x=1} = 0$  下的特解.

**复习3** 求一阶微分方程  $xy' + y = 3x^2$  在初始条件  $y|_{x=1} = 0$  下的特解.

**解答** 通解  $y = \frac{1}{x}(x^3 + C)$ , 特解  $y = \frac{1}{x}(x^3 - 1)$ .

# 一阶微分方程

例 10 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$ .

## 一阶微分方程

**例 10** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$ .

**注记**  $\frac{dx}{dy} + p(y)x = q(y)$  也是一阶线性微分方程.

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

### 第三节

## 二阶微分方程\*

A

可降阶的二阶微分方程

B

二阶常系数线性微分方程

(-)  $y'' = f(x)$  型

例 1 求  $y'' = e^{2x}$  的通解.

(二)  $y'' = f(x, y')$  型

例 2 求  $y'' = \frac{1}{x}y'$  的通解.

(二)  $y'' = f(x, y')$  型

例 2 求  $y'' = \frac{1}{x}y'$  的通解.

练习 1 求  $xy'' + y' = 0$  的通解.

### (三) $y'' = f(y, y')$ 型

例 3 求  $y'' = \frac{3}{2}y^2$  在初始条件  $y|_{x=3} = 1$ ,  $y'|_{x=3} = 1$  下的特解.

### (三) $y'' = f(y, y')$ 型

例3 求  $y'' = \frac{3}{2}y^2$  在初始条件  $y|_{x=3} = 1$ ,  $y'|_{x=3} = 1$  下的特解.

练习2 求  $y'' = 3\sqrt{y}$  满足初始条件  $y|_{x=0} = 1$ ,  $y'|_{x=0} = 2$  的特解.

### 第三节

## 二阶微分方程\*

A

可降阶的二阶微分方程

B

二阶常系数线性微分方程

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

例 4 求微分方程  $y'' + 4y' + 3y = 0$  的通解.

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

例 4 求微分方程  $y'' + 4y' + 3y = 0$  的通解.

1 恒等变形: 得  $(y'' + y') + 3(y' + y) = 0$

## 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

**例 4** 求微分方程  $y'' + 4y' + 3y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + y') + 3(y' + y) = 0$   
2 变量代换: 令  $z = y' + y$ , 则  $z' + 3z = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

.....  
例 4 求微分方程  $y'' + 4y' + 3y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + y') + 3(y' + y) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' + y$ , 则  $z' + 3z = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{-3x}$ , 即  $y' + y = Ce^{-3x}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

例 4 求微分方程  $y'' + 4y' + 3y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + y') + 3(y' + y) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' + y$ , 则  $z' + 3z = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{-3x}$ , 即  $y' + y = Ce^{-3x}$
- 4 求解方程: 得  $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

例 5 求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$  的通解.

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

例 5 求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$  的通解.

1 恒等变形: 得  $(y'' + 2y') + 2(y' + 2y) = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

.....  
例 5 求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + 2y') + 2(y' + 2y) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' + 2y$ , 则  $z' + 2z = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

.....  
例 5 求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + 2y') + 2(y' + 2y) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' + 2y$ , 则  $z' + 2z = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{-2x}$ , 即  $y' + 2y = Ce^{-2x}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

.....  
例 5 求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$  的通解.

- 1 恒等变形: 得  $(y'' + 2y') + 2(y' + 2y) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' + 2y$ , 则  $z' + 2z = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{-2x}$ , 即  $y' + 2y = Ce^{-2x}$
- 4 求解方程: 得  $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$
- 4 求解方程: 得  $y = e^{ax} \left( \int Ce^{(b-a)x} dx + C' \right)$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$
- 4 求解方程: 得  $y = e^{ax} \left( \int Ce^{(b-a)x} dx + C' \right)$ 
  - 当  $a \neq b$  时,  $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$
- 4 求解方程: 得  $y = e^{ax} \left( \int Ce^{(b-a)x} dx + C' \right)$ 
  - 当  $a \neq b$  时,  $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$
  - 当  $a = b$  时,  $y = (C_1 + C_2 x)e^{ax}$

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$
- 4 求解方程: 得  $y = e^{ax} \left( \int Ce^{(b-a)x} dx + C' \right)$ 
  - 当  $a \neq b$  时,  $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$
  - 当  $a = b$  时,  $y = (C_1 + C_2 x)e^{ax}$

---

问题 常数  $a$  和  $b$  是否一定存在? 如何求出它?

# 二阶常系数齐次线性方程

研究二阶常系数齐次线性方程:  $y'' + py' + qy = 0$

- 1 恒等变形: 得  $(y'' - ay') - b(y' - ay) = 0$
- 2 变量代换: 令  $z = y' - ay$ , 则  $z' - bz = 0$
- 3 求解方程: 得  $z = Ce^{bx}$ , 即  $y' - ay = Ce^{bx}$
- 4 求解方程: 得  $y = e^{ax} \left( \int Ce^{(b-a)x} dx + C' \right)$ 
  - 当  $a \neq b$  时,  $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$
  - 当  $a = b$  时,  $y = (C_1 + C_2 x)e^{ax}$

问题 常数  $a$  和  $b$  是否一定存在? 如何求出它?

解答  $a$  和  $b$  是方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根.

研究二阶常系数线性齐次方程:  $y'' + py' + qy = 0$ .

研究二阶常系数线性齐次方程:  $y'' + py' + qy = 0$ .

.....

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

研究二阶常系数线性齐次方程:  $y'' + py' + qy = 0$ .

.....

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根, 则方程的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

研究二阶常系数线性齐次方程:  $y'' + py' + qy = 0$ .

.....

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

- 1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根, 则方程的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

- 2 若  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  为相同实根, 则方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$$

研究二阶常系数线性齐次方程:  $y'' + py' + qy = 0$ .

.....  
设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

- 1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根, 则方程的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

- 2 若  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  为相同实根, 则方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$$

- 3 若  $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$  为共轭复根, 则方程的通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

# 差分

定义 1 对于数列  $y_x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ),

# 差分

定义 1 对于数列  $y_x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ), 称

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$$

为  $y_x$  的 (一阶) 差分;

# 差分

定义 1 对于数列  $y_x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ), 称

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$$

为  $y_x$  的 (一阶) 差分; 称

$$\Delta^2 y_x = \Delta(\Delta y_x) = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x$$

为  $y_x$  的二阶差分.

# 差分

定义 1 对于数列  $y_x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ), 称

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$$

为  $y_x$  的 (一阶) 差分; 称

$$\Delta^2 y_x = \Delta(\Delta y_x) = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x$$

为  $y_x$  的二阶差分.

例 1 求  $y_x = x^2$  的各阶差分.

# 差分

定义 1 对于数列  $y_x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ), 称

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$$

为  $y_x$  的 (一阶) 差分; 称

$$\Delta^2 y_x = \Delta(\Delta y_x) = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x$$

为  $y_x$  的二阶差分.

例 1 求  $y_x = x^2$  的各阶差分.

例 2 求  $y_x = a^x$  的各阶差分.

# 差分的性质

性质 差分具有以下性质：

1  $\Delta(cy_x) = c\Delta y_x$

# 差分的性质

性质 差分具有以下性质：

- 1  $\Delta(cy_x) = c\Delta y_x$
- 2  $\Delta(y_x \pm z_x) = \Delta y_x \pm \Delta z_x$

# 差分的性质

性质 差分具有以下性质：

1  $\Delta(cy_x) = c\Delta y_x$

2  $\Delta(y_x \pm z_x) = \Delta y_x \pm \Delta z_x$

3  $\Delta(y_x z_x) = z_x \Delta y_x + y_{x+1} \Delta z_x$

# 差分的性质

性质 差分具有以下性质：

1  $\Delta(cy_x) = c\Delta y_x$

2  $\Delta(y_x \pm z_x) = \Delta y_x \pm \Delta z_x$

3  $\Delta(y_x z_x) = z_x \Delta y_x + y_{x+1} \Delta z_x$

4  $\Delta \left( \frac{y_x}{z_x} \right) = \frac{z_x \Delta y_x - y_x \Delta z_x}{y_x y_{x+1}}$

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, \Delta y_x, \Delta^2 y_x, \dots, \Delta^n y_x) = 0$$

的方程称为差分方程.

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, \Delta y_x, \Delta^2 y_x, \dots, \Delta^n y_x) = 0$$

的方程称为差分方程.

例 3 说明下面两个方程是等价的:

- $\Delta^2 y_x - 2y_x = 3^x$
- $y_{x+2} - 2y_{x+1} - y_x = 3^x$

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, y_{x+1}, y_{x+2}, \dots, y_{x+n}) = 0$$

的方程称为差分方程.

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, y_{x+1}, y_{x+2}, \dots, y_{x+n}) = 0$$

的方程称为差分方程.

定义 差分方程中未知数列下标的最大值和最小值的差，称为该差分方程的阶.

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, y_{x+1}, y_{x+2}, \dots, y_{x+n}) = 0$$

的方程称为差分方程.

定义 差分方程中未知数列下标的最大值和最小值的差，称为该差分方程的阶.

例 4  $y_{x+2} - y_{x+1} = x$  为一阶差分方程.

# 差分方程

定义 形如

$$F(x, y_x, y_{x+1}, y_{x+2}, \dots, y_{x+n}) = 0$$

的方程称为差分方程.

定义 差分方程中未知数列下标的最大值和最小值的差，称为该差分方程的阶.

例 4  $y_{x+2} - y_{x+1} = x$  为一阶差分方程.

例 5  $y_{x+2} = y_{x+1} + y_x$  为二阶差分方程.

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的**解**.

■ 满足一定的初始条件的解称为**特解**.

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

- 满足一定的初始条件的解称为特解.
- 含有  $n$  个相互独立的任意常数的解称为  $n$  阶差分方程的通解.

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

- 满足一定的初始条件的解称为特解.
- 含有  $n$  个相互独立的任意常数的解称为  $n$  阶差分方程的通解.

**例 6** 一阶差分方程  $y_{x+1} - y_x = 2$ ,  $y_0 = 1$  有特解为

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

- 满足一定的初始条件的解称为特解.
- 含有  $n$  个相互独立的任意常数的解称为  $n$  阶差分方程的通解.

**例 6** 一阶差分方程  $y_{x+1} - y_x = 2$ ,  $y_0 = 1$  有特解为  $y_x = 2x + 1$ .

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

- 满足一定的初始条件的解称为特解.
- 含有  $n$  个相互独立的任意常数的解称为  $n$  阶差分方程的通解.

**例 6** 一阶差分方程  $y_{x+1} - y_x = 2$ ,  $y_0 = 1$  有特解为  $y_x = 2x + 1$ .

**例 7** 二阶差分方程  $y_{x+2} - 3y_{x+1} + 2y_x = 0$  的通解为

**定义 2** 如果一个数列代入差分方程后，方程两边恒等，则称此数列为该差分方程的解.

- 满足一定的初始条件的解称为特解.
- 含有  $n$  个相互独立的任意常数的解称为  $n$  阶差分方程的通解.

**例 6** 一阶差分方程  $y_{x+1} - y_x = 2$ ,  $y_0 = 1$  有特解为  $y_x = 2x + 1$ .

**例 7** 二阶差分方程  $y_{x+2} - 3y_{x+1} + 2y_x = 0$  的通解为  $y_x = C_1 + C_2 2^x$ .

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

研究一阶常系数线性差分方程  $y_{x+1} - ay_x = c.$

研究一阶常系数线性差分方程  $y_{x+1} - ay_x = c$ .

- 若  $a = 1$ , 解为  $y_x = y_0 + cx$ .

研究一阶常系数线性差分方程  $y_{x+1} - ay_x = c$ .

- 若  $a = 1$ , 解为  $y_x = y_0 + cx$ .
- 若  $a \neq 1$ , 解为  $y_x = \left( y_0 - \frac{c}{1-a} \right) a^x + \frac{c}{1-a}$ .

研究一阶常系数线性差分方程  $y_{x+1} - ay_x = c$ .

- 若  $a = 1$ , 解为  $y_x = y_0 + cx$ .
- 若  $a \neq 1$ , 解为  $y_x = \left(y_0 - \frac{c}{1-a}\right)a^x + \frac{c}{1-a}$ .

例 1 求差分方程  $y_{x+1} - 3y_x = -2$  的通解.

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**解答** 设贷款  $x$  个月后欠款余额是  $y_x$  元, 月还款额为  $m$  元, 月利率为  $r$  (即年利率除以 12). 则有

$$y_{x+1} = y_x(1 + r) - m, \quad y_0 = 500000.$$

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**解答** 设贷款  $x$  个月后欠款余额是  $y_x$  元, 月还款额为  $m$  元, 月利率为  $r$  (即年利率除以 12). 则有

$$y_{x+1} = y_x(1 + r) - m, \quad y_0 = 500000.$$

该差分方程的解为

$$y_x = (y_0 - m/r)(1 + r)^x + m/r.$$

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**解答** 设贷款  $x$  个月后欠款余额是  $y_x$  元, 月还款额为  $m$  元, 月利率为  $r$  (即年利率除以 12). 则有

$$y_{x+1} = y_x(1+r) - m, \quad y_0 = 500000.$$

该差分方程的解为

$$y_x = (y_0 - m/r)(1+r)^x + m/r.$$

从而可以解出

$$m = \frac{r[y_0(1+r)^x - y_x]}{(1+r)^x - 1}.$$

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**解答** 设贷款  $x$  个月后欠款余额是  $y_x$  元, 月还款额为  $m$  元, 月利率为  $r$  (即年利率除以 12). 则有

$$y_{x+1} = y_x(1+r) - m, \quad y_0 = 500000.$$

该差分方程的解为

$$y_x = (y_0 - m/r)(1+r)^x + m/r.$$

从而可以解出

$$m = \frac{r[y_0(1+r)^x - y_x]}{(1+r)^x - 1}.$$

当  $x = 240$  时,  $y_x = 0$ ,

**例2** 广州公积金贷款年利率为 3.25%. 现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年. 采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

**解答** 设贷款  $x$  个月后欠款余额是  $y_x$  元, 月还款额为  $m$  元, 月利率为  $r$  (即年利率除以 12). 则有

$$y_{x+1} = y_x(1+r) - m, \quad y_0 = 500000.$$

该差分方程的解为

$$y_x = (y_0 - m/r)(1+r)^x + m/r.$$

从而可以解出

$$m = \frac{r[y_0(1+r)^x - y_x]}{(1+r)^x - 1}.$$

当  $x = 240$  时,  $y_x = 0$ , 代入得到  $m = 2835.97$ .

## 第一节

## 微分方程的一般概念

## 第二节

## 一阶微分方程

## 第三节

## 二阶微分方程\*

## 第四节

## 差分方程的一般概念

## 第五节

## 一阶常系数线性差分方程

## 第六节

## 二阶常系数线性差分方程\*

## 研究二阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{x+2} + py_{x+1} + qy_x = 0.$$

.....

设其**特征方程**  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

## 研究二阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{x+2} + py_{x+1} + qy_x = 0.$$

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

- 1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根，则方程的通解为

$$y_x = C_1 \lambda_1^x + C_2 \lambda_2^x$$

## 研究二阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{x+2} + py_{x+1} + qy_x = 0.$$

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

- 1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根，则方程的通解为

$$y_x = C_1 \lambda_1^x + C_2 \lambda_2^x$$

- 2 若  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  为相同实根，则方程的通解为

$$y_x = (C_1 + C_2 x) \lambda^x$$

## 研究二阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{x+2} + py_{x+1} + qy_x = 0.$$

设其特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  的两个根为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$ .

- 1 若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  为相异实根，则方程的通解为

$$y_x = C_1 \lambda_1^x + C_2 \lambda_2^x$$

- 2 若  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  为相同实根，则方程的通解为

$$y_x = (C_1 + C_2 x) \lambda^x$$

- 3 若  $\lambda_1 = \alpha + i\beta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ,

$\lambda_2 = \alpha - i\beta = r(\cos \theta - i \sin \theta)$  为共轭复根，则通解为

$$y_x = r^x (C_1 \cos \theta x + C_2 \sin \theta x)$$